

# LILLY DIABETES SYMPOSIUM

## Diabetes Herbsttagung 2019

Congress Center Leipzig & Halle 2 der Leipziger Messe  
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig



## Neue Studiendaten zu Trulicity®

Freitag, 08. November 2019 | 12:00 – 13:00 Uhr | Saal 3, Ebene +1 | CCL

12:00 – 12:20 Uhr	<b>Kardiovaskuläre Endpunktstudien in der Diabetologie und Konsequenz für die Praxis</b> Prof. Dr. Oliver Schnell, München
12:20 – 12:25 Uhr	<b>Diskussion</b>
12:25 – 12:55 Uhr	<b>Neue Studiendaten zu Dulaglutid</b> Prof. Dr. Thomas Forst, Mannheim
12:55 – 13:00 Uhr	<b>Diskussion und Ende</b>

Meet the Expert:  
Neue Studiendaten zu Trulicity®  
Prof. Dr. Forst informiert Sie direkt am  
Lilly-Stand über neue Studiendaten.  
Wann: 08.11.2019 um  
09:30 – 09:45 Uhr und 16:10 – 16:25 Uhr

Trulicity® 0,75 mg Injektionslösung in einem Fertigpen, Trulicity® 1,5 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. Wirkstoff: Dulaglutid. **Zusammensetzung:** Jeder Fertigpen enthält 0,75 mg bzw. 1,5 mg Dulaglutid in 0,5 ml Lösung. **Sonstige Bestandteile:** Natriumcitrat, Zitronensäure, Mannitol, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Trulicity ist angezeigt zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes mellitus, um eine verbesserte Blutzuckerkontrolle zu erreichen als: **Monotherapie:** Sofern bei Patienten, für die die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist, durch Diät und Bewegung keine angemessene Blutzuckerkontrolle erreicht werden kann. **Kombinationstherapie:** In Kombination mit anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln einschließlich Insulin, wenn durch diese zusammen mit Diät und Bewegung keine angemessene Blutzuckerkontrolle erreicht werden kann (siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation bzgl. Daten zu verschiedenen Kombinationen). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** *Sehr häufig:* Hypoglykämie (bei Kombination mit Insulin, Glimperid, Metformin oder Metformin plus Pioglitazon), Übelkeit, Diarrhoe, Erbrechen, Bauchschmerzen. *Häufig:* Hypoglykämie (bei Monotherapie oder bei Kombination mit Metformin plus Pioglitazon), verminderter Appetit, Dyspepsie, Verstopfung, Blähungen, abdominale Distension, gastroösophageale Reflux-Erkrankung, Aufstoßen, Fatigue, Sinustachykardie, Atrioventrikulärer Block ersten Grads (AVB). *Gelegentlich:* Überempfindlichkeit, Dehydrierung, Cholelithiasis, Cholezystitis, Reaktionen an der Injektionsstelle. *Selten:* Anaphylaktische Reaktion, akute Pankreatitis, Angioödem. *Sehr selten:* Nicht mechanische intestinale Obstruktion. **Warnhinweise:** Dulaglutid darf nicht bei Patienten mit Typ 1 Diabetes mellitus oder zur Behandlung der diabetischen Ketoazidose angewendet werden. Dulaglutid ist kein Ersatz für Insulin. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Warnhinweise siehe Fachinformation. **Zulassungsinhaber:** Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande. **Vertrieb in Deutschland:** Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg. Verschreibungspflichtig. Stand der Information: August 2019.

# LILLY DIABETES SYMPOSIUM

## Diabetes Herbsttagung 2019

Congress Center Leipzig & Halle 2 der Leipziger Messe  
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig



## „Dead in Bed“ – heute noch ein Thema?

Freitag, 08. November 2019 | 13:15 – 14:15 Uhr | Saal 5, Ebene +1 | CCL

13:15 – 13:40 Uhr

**Schwere Hypoglykämie –  
immer noch eine Herausforderung**

Prof. Dr. Thomas Danne, Hannover

13:40 – 13:45 Uhr

**Diskussion**

13:45 – 14:10 Uhr

**Schwere Hypoglykämie und dann?  
Psychische Folgen und therapeutische Ansätze  
zur Bewältigung**

Prof. Dr. Karin Lange, Hannover

14:10 – 14:15 Uhr

**Diskussion und Ende**

Leben so normal wie möglich

[www.lilly-pharma.de](http://www.lilly-pharma.de)  
[www.lilly-diabetes.de](http://www.lilly-diabetes.de)

*Lilly* | DIABETES